



dintroduction







Gouari
Désignation:
Clos 4 Planche 10 Côté A Nº 1
Vigueur: A
Date de mâturité: le 12.9-1958 Ro.0
Charge:

s. 10
23
30
40
**Monte

Désignation: Lyonari

Clos 4 Planche 10 côté H No 1

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 2-9-59

Charge:

S. 1 2

2 2

3 5

.40

Saible 5

Désignation: Jouan

Clos 4 Planche 10 Côté A No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité 5-9-60

Charge: P=2 +5

S. 1 4
2 4
3 2
4 0
5

Désignation: Gouari

Clos 4 Planche 10 côté A No 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 14,8,61

Chargé: P-2+1

2 2

3 4

4 1

56

Gouari Désignation : Clos & Planche to Rang A Souche Vigueur: 3 Vl 13, 8, 62 Date de maturité : 28.862 Pourriture : GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C). BAIE : TG - G - M - P. ??. -> BV - Gr - Rs - Rg - N. TL 2010 Charge : saveur : (8)- m - ar - fox - herb. s 1 5 Disc - sph - ell - Ov. Obov - cyl - fus. avec pépins - apyrème 8 3 /1 s 4 8 jus : inc - soloré.

Govari

Année 1959 No GRUPE 10 A 1 Planche coté

1	Nombre	1			D A	TES		
!	! Total	123	16.3	1 19-3	23,3	1		1
1 1	1 4.	1 . 0	.0.	! 0 .	2.	1 !	 	1
1 2	5.	. 0.	.0.	0.	1.	1 !	 	1
1 3	14.	.0.	.3.	3.	.3.	1 !	 	
1 4	18.	.2.	.寿.3	3.	.6.	!	 	1
Coulet > 5	i !					!	 	
i	i				le 23-3			

otal [1813	21.3	24.3			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4!	4	1	3 .		1	1
_ 1						1 1
7- 1	4	12	3			
6 !	2	6	6.			
6	1	2	5.			1 1
25	2.				De	22-3-6,00
	6	6 1 2	6 1 1 2	6 1 12 15.		6 1 12 15. 25 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Année: 1761
Emplacement: 24 10A1
Garari

! !Nombre!! total!	133 163	DATES	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1	0 5 1	15-3-612 +9	1

Dle 8.462x +5

Désignation: et Govan

VASSAL CLY Planche 40 Côté A Nº 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc (5) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées (7) en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 4.5.57

Nº ordre

Gouari

Désignation:

VASSAL WA Planche 10 côté A Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duvetsux (8) cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert (8) autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclogiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

Désignation: Gauari

VASSAL Cl 4 Planche 10 côté A No 1 Souche D 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIQRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos colgré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3-52 - vrille rouge foncé 4.

: color6 7 - vert 8. 52 - beurgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr9dite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Gouari'

Désignation

VASSAL planche 10côté A No 1 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: pland en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIONE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle rétiole/compau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

govari

No d'ordre

Désignation

VASSAL St & planche 40 côté A No 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mayerne 2 - Petite 3

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 🐧 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Prida des bosés Yound 1961: 1,669

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyerne Q Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 De coulour blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Frès pruinée 7 pruinés 3 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 23 Forme : discolde 0 sphérolde 0 ellipsolde 0 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9,
 - A ombilic persistant 1 non persistant ().
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore D coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne () épaisse 5.
- 33 A pulpe chargue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 . noyen 2 court 6
- 31 A pédicelle de couleur : verte 0 rouge 5 irrégulière 6,
- 31 A bourvelet de couleur verte 🖰 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelot: évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 0 moyon 5 long 6.
- 32 A pinceau ; coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Andrew Septembe 58

Gauari. Planche côté Rang 4.10.A1.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (I), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausseand M/be

```
CP4 .. vas. PP1.0 Af. Vign.
8 - Angle des nervures . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
            . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
15 - S.L.S. (forme)
            16 - Dents : Forme
            . . . . 1 - (2)-(3)
17 - Dents : Méd/B.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : (1-(2)-3).
                  : (4)- 5.
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Rennes 58 -

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

213

Année :2010

Observateur:

Code cépage: 0Mtp432

NomVar : Cépage non identifié

Nom introduction :Gouari

Emplacement: Vass4R09s331-335

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
Camortie T.	s) 3		26 3	2	
2	11	29/3 lydeb. le 30/3	114 gdib 1/2 214	6	
3	/				
4	6	30/3	1/4	0	
5	8	25/3 Bol/6 a 26/3)	29/3	4	
Moyenne	28		30/3	12	5

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			26/07	2/08	23/8	

+2

Formulaire de description 4/8

Observation entre stades de nouaison et de véraison

très grande hele ophylle entre FA et JF

Année: 2010

Oiv 087

Oiv 088

Oiv 089

Vassal

Programme: GrapGene06 Nom introduction: Gouari

Oiv 086 Densité p. couchés des nerv. face inf.

Densité p. dressés des nerv. face inf.

Densité p. couchés limbe face sup.

Villosité couchée nerv.principales face sup

Villosité dressée nerv. principales face sup

Observateur : Lacombe Code introduction: 0Mtp432

Emplacement: Vass4R09s331-335

Forte

Forte

Forte

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Faible

Faible

Très forte

Très forte

Présente

Présente

Très forte

LIMBE 5 Code Descripteur 3 Très petite Petite Moyenne Grande Très grande Oiv 065 Taille 2-Cunéiforme 3-Pentagon 4-Orbicul. 5-Rénif. 1-Cordiforme Oiv 067 Forme du limbe 5- + de sept 1-F. entière 2-Trois 3-Cinq 4-Sept Oiv 068 Nombre de lobes Vert clair Vert moyen Vert foncé Oiv 069 | Couleur face supérieure limbe 2- Point 3- Jusqu'à 4- Après Pigmentation anthocyanique (rouge) des 1- Nulle Oiv 070 1ère bifurc. 1ère bifurc. pétiolaire nervures, face supérieure 2- Point 3-Jusqu'à 4- Après Pigmentation anthocyanique (rouge) de 1- Nulle Oiv 071 1 ère bifurc. lère bifurc. pétiolaire nervures, face inférieure 4-Révoluté 1-Plan 2-En V 3-Involuté 5-Tourmenté Oiv 074 Profil du limbe Présente Oiv 073 Ondulation du limbe (entre nerv I ou II) Absente Gaufrure du limbe Présente Absente Oiv 072 (dépression entre nervures I et II) Cloqûre du limbe, face sup. Forte Très forte Nulle à t. fb. Faible Moyenne Oiv 075 (relief entre nervures de dernier ordre) Faible Moyenne Forte Très forte Nulle à t. fb. Oiv 084 Densité p. couchés entre nerv. face inf. Très forte Faible Moyenne Forte Nulle à t. fb. Oiv 085 Densité p. dressés entre nerv. face inf.

Forte Très forte Faible Moyenne Nulle à t. fb. Vassal Densité p. dressés limbe face sup. PETIOLE Faible Moyenne Forte Très forte Nutle à t. fb. Oiv 090 Densité poils couchés Très forte Forte Nulle à 1. fb. Faible Moyenne Oiv 091 Densité poils dressés Beaucoup Beaucoup plus Plus long Plus court Égal Longueur pétiole p/r nervure médiane Oiv 093 plus long court 2-partiellement 3-vert 1-coloré Couleur du pétiole Vassal coloré

Nulle à t. fb.

Nulle à t. fb.

Absente

Absente

Nulle à t. fb.

	SINUS PET	FIOLAIRE (égalemer	nt observable sur	r feuilles d'herbi	ier, formulaire	n° 7)		
Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	2- ouvert	3- peu ouvert		5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants	
Oiv 080	Forme de la base	1- en U	2- en accolade	3- en V				
	Dent sur le bord			2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents				
Oiv 81-2	Base dégarnie	1- Absence	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés				

	SINUS LATERAUX SUPERIEURS (également observa	able sur feuilles	d'herbier, for	mulaire n° 7)	
Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus		3- fermés	4- lobes très chevauchants	
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraus supérieurs	Absence	Peu profond	Moyens	Profonds	Très profonds
Oiv 83-1	Forme	T- en U	2- en accolade	3- en V		
Oiv 93 2	Dent	Absence	2- Présence fréquente			

OIV 05-2	Dent				The second secon					
	DENTS (également obser	vable sur feuille	s d'herbier, form	nulaire n° 7)						
Oiv 076	Forme bien mucrones	1- côtés concaves	2- côtés rectilignes	3- notations 2 + 4	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe				
Oiv 077	Taille	Très petites	Petites	Moyennes	Grandes	Très grandes				
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	Moyennes	Longues	Très longues				
	AUTRE CARACTERE OBSERVABLE A CETTE PERIODE									
Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	(Élevé) (51-70%)	Très élevé (>80%)				

Formulaire de description 5 / 8 Observation à maturité physiologique Observateur: TD sur lasse

Année : 2010

Programme: GrapGene06 Nom introduction: Gouari Code introduction: 0Mtp432

Emplacement: Vass4R09s331-335

~					
G	D	A	D	\mathbf{D}	TO 1
U	\mathbf{r}	2.7		г	

the same of the sa		Control of the State of the Sta				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm):	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm): - Z	Très étroite (<5 cm)	Etroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base sculement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une artrois	3- Plus de trois ailes		

BAIE

						_				
Oiv 220	Longueur Valeur absolue	(en cm): 4	14 m	Très courte (<8mm)	Courte (8-14m			oyenne -20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue (>26mm)
Oiv 221	Largeur Valeur absolue	~	14 m	Très étroite (<8mm)	Etreit (8-14m		1000	oyenne -20mm)	Large (20-26mm)	Très large (>26mm)
Oiv 222	Uniformité de la			1-Non uniforme	3-Unifo	me				
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Ti	and the same of th	6- Obovořd	e Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme		1- Vert jaune	2- Rose	3- Roug	e		4- Gris	5- Rouge-Violet	Bleu-Noir
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme		Non uniforme	Unifor	me					
Oiv 227	Pruine	Pruine			Faibl	e	Moyenne		Forte	Très forte
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Mine	5	Mo	oyenne	Epaisse	Très épaisse
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Peu apparent	2- Appare	ent				
Oiv 229	Ombilic (dépression)		1- Déprimée	2- No déprin						
Oiv 230	Coloration de la p	oulpe		1-Non coloree	2- Color	ée				
Oiv 231	Intensité de la col	loration d	e la pulpe	Non colorée	Faibl colorat			oyenne oration	Forte coloration	Très forte coloration
Oiv 232	Succulence de la	pulpe		1- Peu juteuse	Julien	se				
Oiv 233	Rendement en jus	s (ml / 100g	g baies)		Faibl	e	N	loyen	Elevé	
Oiv 235	Fermeté de la pul			Très faible	Faib	le	Me	oyenne	Elevée	Très élevée
Oiv 236	Saveur			1-Aucune	2- Musc	atée	3-	Foxée	4- Herbacée	5-Autre
Oiv 238	Longueur pédicel	lle		Très court (<4mm)	Cour (4=8m		1,133	loyen 12mm)	Long (12-16mm)	Très long (>16mm)
Oiv 240	Séparation du péc	dicelle		Très facile	Facil	e	N	loyen	Difficile	Très difficile

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins		1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm): 50	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs	
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm):	Très faible (<10mg)	Faible (25mg))	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65mg)	
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes				

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2010 1/10/1 2016

Programme: GrapGene06

Nom introduction: Gouari

Code introduction: 0Mtp432

Emplacement: Vass4R09s331-335

Observateur: Marchal

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 + forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue:

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : __

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »

DESIGNATION & GOUARI

Poids de 100 pépins

Poids moyen d'1 baie

1961 - 4-16 A1 = 1,669

X 2 S 9

Poids moyen d'1 grappe